Comet oj Contest #3题解

A.比赛

出题人NiroBC 暴力列出所有可能的比赛，排序后取前K大。

热心网友晚来风雪水长东

题目上说总共有n只小猫，每只小猫的实力值是 a_i ，每两只小猫之间会进行一场精彩度为 $a_i + a_j$ 的比赛，所以我们可以用两层for循环遍历每两只小猫来将每两只小猫比赛的精彩度全部存入num数组，再对num数组进行从小到大sort排序，因为num数组最后的那项是最大的，因此从最后那项开始往前加，加够k个就是前k大之和了，即为答案。

[参考代码](#)

B.棋盘

出题人NiroBC

状压dp。

热心网友晚来风雪水长东

题目意思就是说通过把0变成1来将所有1变成一个联通块，要求最少的变换个数。我是用的暴力模拟，从第一列开始遍历每一列，因为只有两行，含1的每一列无非就是：上1下1，上1下0，上0下1；只有这三种情况是需要变化前面列的0来使1联通的，观察这三种情况，上1下1时，变换个数就是上一次有1的列号与当前列号差值的绝对值-1(直接由上一个有1的位置沿着行直线变化到当前列)；上1下0时，就需要看上一次有1的那一列的1的情况了，如果上一次有1处和当前列有1处是同一行，说明可以直线变换过来，变换个数就是上一次有1的列号与当前列号差值的绝对值-1，如果不是同一行，则需要多加1(需要多变换一个棋子)；上0下1的情况和上一种情况类似解法。因此关键就是保存上一次有1处的那列情况，在遇到某列有1时考虑上面的情况然后累加就行了。

[参考代码](#)

C.子序列子序列子序列...

出题人ccz181078

设 $m = m_0 2^c$ ，其中 m_0 是奇数。若一个序列 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 包含k个元素，则它的每个元素出现在 2^{k-1} 个子序列中，因此它是完美的当且仅当 $2^{k-1}(a_1 + a_2 + \dots + a_k)$ 是m的倍数，即 $(a_1 + a_2 + \dots + a_k)$ 是 $m/2^{\min(k-1, c)}$ 的倍数。记 $f(i, j, k)$ 表示 $a_1, a_2, \dots, a_i$ 中，长度j ($1 \leq j \leq c$)，求和后对 $m/2^{j-1}$ 取模得到k的子序列的个数； $g(i, k)$ 表示 $a_1, a_2, \dots, a_i$ 中，长度至少为c+1，求和后对 $m/2^c$ 取模得到k的子序列的个数。考虑一个子序列是否包含 a_i ，可以递推求出 $i = n$ 时的结果，总的答案就是 $g(n, 0) + \sum_{j=1}^c f(n, j, 0)$ 。计算 $f(i, j, k)$ 是 $O(1)$ 的，而对每个j， $f(i, j, k)$ 共有 $nm/2^{j-1}$ 项，因此总的时间复杂度是 $O(nm(1 + 1/2 + 1/4 + \dots)) = O(nm)$ 。

D.可爱的菜菜子

出题人nzhtl1477

如果是单点修改，这题就是一个线段树维护区间线性基的题，但这里是区间xor

我们考虑维护原序列的xor差分，这样每次修改的时候只需要修改两个位置的值就可以了，不用修改一个区间。查询的时候，只需要特判边界，因为简单的线性代数知识告诉我们维护xor差分的线性基和原序列的线性基是等价的。

总复杂度 $O(n \log n \log^2 w)$ ，似乎存在 $O(n \log n \log w)$ 的四毛子做法。

E.说好的交换律呢？

出题人dreamoon

最暴力的有了这个式子，我们已经能做到 $O(x)$ 了！

但若只是这样，这题就不会是 $problem E$ 的难度。

$x / i * j = x * j / i$ 这个条件很难去解析，所以先试着转换这个条件：

(虽然叙述里的 $/$ 号是整数除法，但从这里开始，使用的除号都是精确运算。)(在这里 $x \% i$ 的运算符和C语言意思一样，都代表着整数 x 除以整数 i 的余数，值为一个介于 $0 \sim i - 1$ 之间的数。)

叙述里的条件就是：

$$(x - x \% i) / i * j = (x * j - (x * j) \% i) / i$$

首先，左右同乘 i 后得到：

$$(x - x \% i) * j = x * j - (x * j) \% i$$

左右两式减去 $x * j$ 并取负后得到：

$$x \% i * j = (x * j) \% i$$

其中 $(x * j) \% i$ 就是 $((x \% i) * j) \% i$

$$\text{令 } v = (x \% i) * j$$

至此我们推得 $v = v \% i$ 。

$v \% i$ 的充要条件就是 $v < i$

所以最终我们得到 $(x \% i) * j < i \rightarrow j < \frac{i}{x \% i}$ 。

若固定 i 的值，我们能推论出 $1 \leq j \leq \lceil \frac{i}{x \% i} \rceil - 1$ 。

于是本题答案为： $\sum_{i=1}^a \min(\lceil \frac{i}{x \% i} \rceil - 1, b)$

于是我们已经能做到 $O(x)$ 了！

但若只是这样，这题就不会是 $problem E$ 的难度。

接着，我们分成 $i > x$ 和 $i \leq x$ 的情况。

$i > x$ 时， $x \% i$ 的值就是 x ，

可能组数为 $\sum_{i=x+1}^a (\lceil \frac{i}{x} \rceil - 1) = x \cdot \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{a}{x} \rfloor - 1} i + (a \% x) \cdot \lfloor \frac{a}{x} \rfloor$ 。

可以 $O(1)$ 算出。

$i \leq x$ 时，其作法和以下经典问题类似：

给定 n ，求 $\sum_{i=1}^n \lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 。

这个经典问题的解法大概就是： $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 的可能值只有 $O(\sqrt{n})$ 个，且对于每个可能的 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 值，能得到该值的 i 都是连续的整数。

令 $(\lfloor \frac{x}{i} \rfloor, \lceil \frac{i}{x \% i} \rceil)$ 的值等于 (c, q) , 同时 q 也等于 $\lceil \frac{i}{x - c \cdot i} \rceil$, 于是可发现, 当 c 为定值时, $\frac{x}{x \% i}$ 的值随 i 值递增而递增。于是上界就是满足 $\lceil \frac{i}{x - c \cdot i} \rceil \leq q$ 的最大的 i 。

$$\begin{aligned} \lceil \frac{i}{x - c \cdot i} \rceil \leq q &\rightarrow \frac{i}{x - c \cdot i} \leq q + 1 \rightarrow i \leq (q + 1) \cdot (x - c \cdot i) \rightarrow i \cdot (c + c \cdot q + 1) \leq (q + 1) \cdot x \\ &\rightarrow i \leq \frac{(q+1) \cdot x}{c+c \cdot q+1} \end{aligned}$$

所以上界会是 $\lfloor \frac{(q+1) \cdot x}{c+c \cdot q+1} \rfloor$ 。

最后是要描述下区间数量的复杂度证明, 这是本题最难的部分了, 相信很多人都和出题者本人一样, 代码先写再说, 复杂度的证明就先搁着(实际上此证明试验题者给出的..., 比出题者出题时约略证出的复杂度还优秀, orz ccz181078)。

证明如下:

再提示大家一些变量的定义一次: 假定 $\lfloor \frac{x}{i} \rfloor, \lceil \frac{i}{x \% i} \rceil$ 的值分别是 c, q 。

先假定有一个常数 M 。

对于相同一个 c 而言,

q 值 $\leq M$ 的组数最多有 q 组。

q 值 $> M$ 时,

1. 由于 $q = \lceil \frac{i}{x - c \cdot i} \rceil > M \rightarrow \lfloor \frac{i}{x - c \cdot i} \rfloor \geq M \rightarrow \frac{i}{x - c \cdot i} \geq M \rightarrow i > M \cdot (x - c \cdot i)$
 $\rightarrow (1 + M \cdot c) \cdot i \geq M \cdot x \rightarrow i \geq \frac{M \cdot x}{1 + M \cdot c} \rightarrow i \geq \frac{x}{\frac{1}{M} + c}$

2. 由于 $\lfloor \frac{x}{i} \rfloor = c, \rightarrow \frac{x}{i} \geq c \rightarrow i \leq \frac{x}{c}$

综合和 1.2., 我们有 $\frac{x}{\frac{1}{M} + c} \leq i \leq \frac{x}{c}$, 所以 i 的可能数量至多约有 $\frac{x}{c} - \frac{x}{\frac{1}{M} + c} = \frac{\frac{1}{M} \cdot x}{c(\frac{1}{M} + c)} = \frac{x}{1 + c^2 \cdot M} \leq \frac{x}{c^2 \cdot M}$ 。

最后我们取 $M = \frac{\sqrt{x}}{c}$, 那么可证明区间数量不超过 $M + \frac{x}{c^2 \cdot M} = \frac{\sqrt{x}}{c} + \frac{\sqrt{x}}{c} = O(\frac{\sqrt{x}}{c})$

最后按不同的 c 值做加总能得到区间数的复杂度为:

$$O(\sum_{c=1}^x \frac{\sqrt{x}}{c}) = O(\sqrt{x} \cdot \sum_{k=1}^x \frac{1}{k}) = O(\sqrt{x} \cdot \ln x)$$

F.毒瘤的菜菜子

出题人 **nzhtl1477**

第十四分块

我们考虑莫队维护

每次把区间 $[l, r]$ 拓展到 $[l, r + 1]$ 的时候需要维护 $a[r + 1]$ 和 $[l, r]$ 这段区间的贡献

这里利用莫队二次离线的 *trick*:

莫队就可以抽象为 $O(n\sqrt{m})$ 次转移, 每次查询一个序列中的位置对一个区间 $[l, r]$ 的贡献

这个贡献是可以差分的, 也就是说把每次转移的 $a[r + 1]$ 对区间 $[l, r]$ 的贡献差分为 $a[r + 1]$ 对前缀 $[1, r]$ 的贡献减去对前缀 $[1, l - 1]$ 的贡献

然后通过这个差分我们可以发现, 我们把 $O(n\sqrt{m})$ 次的修改降低到了 $O(n)$ 次修改, 因为前缀只会拓展 $O(n)$ 次

于是我们每次可以较高复杂度拓展前缀和, 因为插入次数变成了 $O(n)$ 次

然后这里我们离线莫队的转移的时候可以做到线性空间, 因为每次莫队是从一个区间转移到另一个区间:

我们记下 $pre[i]$ 为 i 的前缀区间的答案, $suf[i]$ 为 i 的后缀区间的答案

考虑把区间 $[l1, r1]$ 拓展到区间 $[l1, r2]$:

$[l1, r1]$ 区间的答案为红色部分的贡献, $[l1, r2]$ 区间的答案为红色部分加上绿色部分的贡献, $r2$ 的前缀贡献为所有的贡献, $r1$ 的前缀贡献为红色的贡献与前两个蓝色的贡献

于是我们可以把绿色的贡献, 也就是两次询问的差量差分为 $pre[r2] - pre[r1] - [1, l1 - 1]$ 对 $[r1 + 1, r2]$ 的贡献

然后我们再差分一下 $[1, l1 - 1]$ 对 $[r1 + 1, r2]$ 的贡献为 $[1, l1 - 1]$ 对 $[1, r2]$ 的贡献减去 $[1, l1 - 1]$ 对 $[1, r1]$ 的贡献, 这里每个位置开个 $vector4$ 存一下就可以了

于是我们达成了 $O(n + m)$ 的空间复杂度将莫队给二次离线

现在考虑怎么算这个贡献, 我们要高效计算区间 $[l, r]$ 对 x 的贡献时

先把贡献拆开变成: $[l, r]$ 中 x 的倍数个数, $[l, r]$ 中 x 的约数个数

$[l, r]$ 中 x 的倍数个数: 每次前缀加入一个数 $a[i]$ 的时候, 我们把 $a[i]$ 的约数位置所对应的数组 $pre1$ 的位置都++然后查询的时候直接查 $pre1[x]$ 即可得到 x 倍数个数

$[l, r]$ 中 x 的约数个数: 这里考虑对 x 的约数进行一次根号分治

对于所有 x 大于 $\sqrt{r}$ 的约数, 我们拓展前缀的时候维护, 即每次把 $a[i]$ 的倍数位置所对应的数组 $pre2$ 的位置都++然后查询的时候直接查 $pre2[x]$ 即可得到 $x \neq \sqrt{r}$ 的约数个数

对于所有 x 小于 $\sqrt{r}$ 的约数, 我们考虑每次直接枚举区间 $[l, r]$ 中 $1, 2, \dots, \sqrt{r}$ 的出现次数

这里可以用 $fractionalcascading$ 的 $trick$ 做到 $O(\sqrt{r} + \log n)$ 单次, 线性空间

于是我们得到了一个总时间复杂度 $O(n\sqrt{r}m)$, 空间 $O(n + m)$ 的做法